

AVERTISSEMENTS AGRICOLES



STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

MINISTRE DE L'AGRICULTURE
DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE
ET DE LA FORET
SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX
Ancienne Conserverie de CASAMOZZA
LUCCIANA - 20290 - BORGIO -

☎ 95.36.05.70



EDITION CORSE

Bulletin Technique N° 202

du 15 JUILLET 1991

VIGNE

Vers de la grappe

Les vols se maintiennent à ALERIA.

Les pontes continuent dans les régions de Casa Perta, ALERIA
Les produits Inségar et Cascade déjà appliqués doivent être soutenus 15
jours après avec un préventif ou un produit à deux fins (voir liste dans
le bulletin n°201)

Oïdium

Toujours d'actualité, on observe des symptômes sur feuilles et
grappes sur tous cépages.

Mildiou

Le risque climatique est bas. Maintenir la couverture.
Le stade fermeture de la grappe à veraison autorise le cuivre.

Pourriture grise :

Intervenir dans les parcelles sensibles à cette maladie et aux
attaques de vers de la grappe favorisant le développement de la maladie.
Eviter la Procymidone si vous devez exporter vos vins vers les U.S.A.
(voir liste des produits ci-jointe)..

ARBRES A NOYAUX

Tordeuse Orientale du pêcher

Renouveler les traitements suivant les dates de récolte.

Monilia

En cas de risque (variétés sensibles, vergers irrigués en aspersion) intervenir sur les variétés proches de la récolte avec :

Benomyl	(BENLATE)
Iprodione	(KIDAN ROVRAL)
Sumisclex	(PROCYMIDONE)
Vinchlozoline	(RONILAN)
Triforine	(SAPROL FUNGINEX)

Oïdium

Maintenir la protection.

Cératite : Mouche des fruits

Pas de capture pour l'instant, pas de dégâts sur variétés précoces de pêches, inutile de dépenser un traitement pour rien.

Acarie

Méfiez vous des remontées subites des populations.

Surveiller ou faites vérifier leur présence sur feuilles par les techniciens.

Cochenilles

La migration des jeunes larves se poursuit dans certains vergers. Utiliser de l'Ultracide bouillie et Ekalux sur pêchers, ne traiter pas inconsidérément car les prédateurs sont présents, utiles, mais très fragiles; sachez les conserver

Pruniers

Un traitement contre la rouille est recommandé.

Contre le monilia intervenez sur variétés sensibles qui "éclatent". Soyez vigilants aux attaques de vers de carpocapse sur variétés tardives. une exudation de gomme sur fruit révèle souvent la présence de larves.

Figuier

La mouche de la figue

Attaque insidieusement les figues vertes qui chutent ; dans le fruit mur ,on découvre des "asticots"

Ces inconvénients peuvent durer tard en saison, si l'on n'y prend garde.

Tout d'abord piéger les mouches avec un gobe mouches du commerce ou bricolé comme suit :


Couper en deux une bouteille d'eau minérale (plastique).

Retourner la partie supérieure, l'enfoncer goulot en avant dans la partie inférieure dans laquelle on aura verser du vinaigre additionné d'un peu d'eau ou quelques gouttes de "Buminal"

Suspendre le gobe mouches dans l'arbre côté sud.

Dés les premières captures, on peut pulvériser le soir de préférence un insecticide à base de :

- Malathion	Rémanence	8 jours
- Fenthion	"	15 "
- Deltamethrine	"	25 "



Vérifier les captures tous les jours, nettoyer les gobe mouches.

AGRUMES

Cochenilles

Vérifier les sorties de larves pour intervenir.

Aleurodes

De nombreuses pontes de "Dialeurodes citri" sont observées sur jeunes feuilles. Attendre les éclosions pour intervenir.

Grossissement des fruits : Vérifier le calibre sur plusieurs arbres pour intervenir avec "Fixofruit ou Corasil E"

CULTURES LEGUMIERES

Melons

Mildiou

Les cas sont rares pour l'instant. Ne pas confondre avec la "grillure". Maintenir cependant la protection avec les fongicides suivants. Attention pas plus deux traitements avec "Acylon T."

Spécialités commerciales	Matières actives/Doses hl-PC	Délai avant récolte
DACONIL 500	Chlorothalanil 0,3 l	7 jours
DITHANE m 45	Mancozèbe 80% 0,2 Kg	Non fixé
POLIRAM D.F.	Métiram zinc 80% 0,250	-
PREVICUR N	Propamocarbe Hcl 0,3 l	-
RHODAX	Phosethyl Al 44% 0,35 Kg	-
	Mancozèbe 26 %	
PULSAN	Mancozèbe 56 % 0,25 Kg	-
	Oxadixyl 8 %	
	Cymoxanil 3,2 %	-
ACYLON T	Métalaxyl 25 % 0,2 Kg	7 jours
	Manèbe 50 %	

TOMATE

Mineuses *Lyriomyza huidobrensis*.

Faites vérifier la présence de cette petite mouche mineuse de 2,5 mm de longueur, noire tachée de jaune.

Avant, intervenir avec :

- VERTIMEC = 0,05 l. hl
- TRIGARD 75 WP = 0,04 Kg/hl

Attaque aussi chrysanthèmes.

(C) - S.R.P.V. 1991 - toute reproduction même partielle est soumise à notre autorisation.

PRODUITS HOMOLOGUES CONTRE LA POURRITURE GRISE

SPECIALITES COMMERCIALES	MATIERES ACTIVES	FIRME	DOSE l ou kg/ha
SUMISCLEX	procymidone	Sopra	1,5
RONILAN	vinchlozoline	Basf	1
RONILAN FL	"	"	1
KIDAN	iprodione	Rhodiagri	3
ROVRAL		Littorale	1,5
RONILAN SP	vinchlozoline+ soufre	Rsr	30
SILBOS DF	vinchlozoline+ thirame	Basf	5
DIRAC EXPRESS	iprodione + thirame	Rhodiagri Littorale	6
BENLATE 50 DF	bénomyl	Du Pont	1
NBS SPECIALITES	carbendazime	-	1
PELT 44 liquide	thiophanate- méthyl	Procida	3
SUMICO	diéthofencarbe+ carbendazime	Sopra	2
EUPARENE	dichlofluanide	Bayer	4
NBS SPECIALITES	folpel	-	3
BASULTRA DF	thirame	Basf	4
RHODIASAN	"	Rhodiagri Littorale	"
BANKO CT 50	clorothalonil+ thirame	Marty Parazols	7
ORGANIL 648	thiophanate- méthyl + folpel	Procida	5
BTF	folpel + thirame + carbendazime	Pépro	3,5